
DESCRIPTION

DE PLUSIEURS LONGICORNES APPARTENANT AU GENRE
Pteroplatus, TRIBU DES *Cerambycins*.

Par M. Lucien BUQUET.

(Séance du 2 juin 1844.)

Dans un petit travail que j'ai publié dernièrement (Annales de la Société, tome IX, page 385), j'ai donné, avec les caractères du genre *Pteroplatus*, la description de cinq espèces, les seules qui fussent alors en ma possession. Mais depuis, MM. DE BRÈME et REICHE ont bien voulu mettre à ma disposition les espèces du même genre qui font partie de leurs collections, et j'ai profité avec empressement de cette communication amicale pour compléter, autant que possible, la description des espèces de ce genre intéressant.

6. *Pteroplatus fasciatus*, BUQ.

Ater, *thoracis margine flavescente*; *elytris dilatatis nigro-cyaneis*,
fascia media lata flava, *pedibus abdomineque nigro-piceis*.

Long. 14 à 18 millim., larg. 7 à 10 millim.

Il est un peu plus petit que le *Pulcher*. La tête est noire, légèrement convexe, et au milieu, entre les antennes, se trouve une petite côte longitudinale brillante; le labre et les parties de la bouche sont rougeâtres, à l'exception du dernier article des palpes et de l'extrémité des mandibules qui sont noirs. Les antennes sont de cette dernière couleur, et les troisième, quatrième, cinquième et sixième articles sont ornés, en dehors, de touffes de poils assez longs. Le corselet est noir, il a, près de chaque bord latéral, une ligne d'un jaune pâle. L'écusson

est noir, il est un peu plus long que large. Les élytres planes, un peu plus larges à la base que le corselet, et coupées carrément, se dilatent peu après les angles huméraux; elles sont d'un noir bleuâtre assez brillant, arrondies et couvertes à l'extrémité de petits tubercules. Un peu au delà du milieu se trouve une bande d'un jaune pâle, visible aussi en dessous, et qui se dilate un peu le long de la bordure. Le dessous du corps et les pattes sont brunâtres.

Cet insecte se distingue facilement du *Pulcher* par les lignes jaunes, dont le corselet est orné, et par l'absence des taches humérales.

Il a été trouvé en Colombie.

7. *Pteroplatus elegans*, Buq.

Capite nigro; thorace flavescente linea media nigra; elytris flavis, dilatatis, macula apice fasciaque media nigris.

Long., 14 à 17 millim.; larg., 8 à 10 millim.

Il est un peu moins grand que le précédent. La tête est noire, elle a une petite côte élevée entre les antennes; le labre et les parties de la bouche sont jaunes, à l'exception des palpes et de l'extrémité des mandibules, qui sont brunâtres; en arrière de la tête se trouve une tache jaune transversale séparée au milieu par une ligne noire. Les antennes sont de cette dernière couleur, et ornées de touffes de poils sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième articles. Le corselet, d'un jaune pâle et velouté, a dans le milieu une ligne noire assez large; en dessous, il est encadré de noir. L'écusson est noir également et assez petit. Les élytres sont jaunes, un peu plus larges que le corselet, coupées carrément à la base, dilatées, presque planes et tuberculées à l'extrémité; elles ont deux côtes longitudinales élevées dont la plus saillante part de l'angle huméral, et va se perdre dans la tache noire et triangulaire

qui se trouve à leur extrémité. Elles ont de plus, dans le milieu, une large bande noire transversale qu'on voit aussi en dessous, et qui recouvre et la bordure et la suture. Le dessous du corps et les pattes sont d'un noir assez brillant.

Il se trouve en Colombie.

M. REICHE possède dans sa collection une variété de cette espèce, remarquable en ce que la bande noire du milieu des élytres manque entièrement; on voit seulement sur chacune d'elles, près de la bordure, une petite tache noirâtre arrondie et faiblement marquée.

8. *Pteroplatus dimidiatipennis*, BUQ.

Capite nigro; thorace flavescente, linea media nigra; elytris flavis, dilatatis, macula magna apice, antennis pedibusque nigris.

Long., 17 millim.; larg., 9 millim.

Cette espèce, quoique beaucoup plus grande que la *Gracilis*, en est cependant très voisine. La tête est noire, le labre et les parties de la bouche sont jaunes, excepté les palpes et l'extrémité des mandibules, qui sont d'un brun noirâtre: en arrière de la tête, se trouve une tache jaune transversale séparée au milieu par une ligne noire. Les antennes sont de cette dernière couleur, et ornées de touffes de poils sur le bord externe des troisième, quatrième, cinquième et sixième articles. Le corselet, d'un jaune soyeux, a dans le milieu une ligne noire assez large; en dessous, il est encadré de noir, excepté au bord antérieur. L'écusson est noir et petit. Les élytres, d'un jaune pâle, ont à l'extrémité une large tache noire qui atteint presque la moitié de leur longueur. Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Cette espèce, par son affinité avec la *Gracilis*, pourrait bien n'en être qu'une variété qui aurait acquis un plus grand développement. Cependant, indépendamment de la tache qui est à l'extrémité des élytres, et beaucoup plus grande, elle se distingue encore de l'autre par la couleur des pattes, qui sont entièrement noires.

Elle a été trouvée aussi en Colombie.

J'ai vu dans la collection de M. REICHE un individu que j'ai cru devoir rapporter plus positivement à la *Gracilis*, il n'en diffère que par une tache noire et ovale, qui se trouve placée obliquement sur le milieu de chaque élytre.

9. *Pteroplatus bilineatus*, BUQ.

Pallidus; thorace bilineato; elytris vix dilatatis; antennis pedibusque nigro-piceis.

Long. , 41 millim. ; larg. , 4 millim.

Cet insecte s'éloigne des autres par son extrême délicatesse, et par sa forme relativement beaucoup moins élargie. Il est d'un jaune-paille; une ligne noire se trouve de chaque côté de la tête. Les antennes sont d'un noir-brun et ornées de touffes de poils comme dans les espèces précédentes. Le corselet a sur chacun des bords latéraux deux lignes noires, la première placée en dessus, faisant suite à celle de la tête, la seconde se trouve en dessous. L'écusson est très petit, et de la couleur générale de l'insecte. Les élytres, de la largeur du corselet à la base, et coupées carrément, sont peu dilatées, et les côtes en sont à peine distinctes; elles sont légèrement bordées de noir à l'extrémité, et l'on n'aperçoit aucune trace de tuber-

cules comme dans les autres espèces que j'ai observées. Le dessous du corps et les pattes sont d'un brun noirâtre, les cuisses antérieures seulement sont rougeâtres.

Il a été trouvé en Colombie.